

Prendre DUKORAL® avant votre départ en voyage



Quand prendre DUKORAL® pour prévenir la diarrhée causée par *E. coli* entérotoxigène (ETEC) producteur de LT¹

Prise de DUKORAL® pour la première fois¹ – Adultes et enfants de 2 ans et plus

2 semaines avant le départ



Si plus de 6 semaines se sont écoulées entre les deux doses, il faut reprendre la primovaccination à partir du début.

1^{ère} dose

Prendre la 1^{ère} dose au plus tard 2 semaines avant le départ en voyage

Date : _____

1 semaine avant le départ



La protection commence environ 1 semaine après la prise de la 2^{ème} dose et dure environ 3 mois.

2^{ème} dose

Prendre la 2^{ème} dose au moins 1 semaine après la 1^{ère} dose, et au plus tard 1 semaine avant le départ en voyage

Date : _____

Départ en voyage



Dose de rappel de DUKORAL®¹

Si vous avez pris DUKORAL® entre 3 mois et 5 ans auparavant, une seule dose de rappel suffit pour renouveler votre protection.

1 semaine avant le départ



Si plus de 5 années se sont écoulées depuis l'administration de votre dernière dose, il est recommandé de reprendre la primovaccination à partir du début (2 doses) afin de renouveler votre protection.

1 dose de rappel

Date : _____

Départ en voyage



Comment préparer DUKORAL® ?

Vaccin offrant la commodité de l'administration par voie orale



1^{ère} étape

Préparer la solution tampon : Ouvrir le sachet de la solution tampon et faire dissoudre les granules dans 150 mL (5 oz) d'eau fraîche. **N'utiliser aucun autre liquide.**

Pour les enfants de 2 à 6 ans¹ : Jeter la moitié du mélange obtenu avant de passer à l'étape 2.



2^{ème} étape

Mélanger bien le vaccin en agitant la petite fiole en verre qui le contient.



3^{ème} étape

Mélanger le vaccin avec la solution tampon : Ouvrir une fiole et ajouter le vaccin à la solution tampon (mélange d'eau et de granules) dans le verre. Mélanger bien le produit et le boire immédiatement ou dans les 2 heures suivant sa préparation, mais pas plus tard. Conserver à la température ambiante.

Conserver à la température ambiante.

Il faut éviter de manger et de boire 1 heure avant et 1 heure après la prise de DUKORAL®.

Entreposage et stabilité¹

CONSERVER LE VACCIN AU RÉFRIGÉRATEUR entre 2 et 8 °C (de 35 à 46 °F). **NE PAS CONGELER.**

Le vaccin peut être conservé à la température ambiante (jusqu'à 25 °C), pendant une période maximale de deux semaines à une seule occasion. Une fois que le vaccin a été mélangé avec la solution tampon, il doit être utilisé durant les 2 heures qui suivent.

Ne pas utiliser ce vaccin après la date de péremption.

DIN 02247208

Prévenez la diarrhée causée par *E. coli* entérotoxigène en prenant
DUKORAL®¹
2 semaines avant votre départ pour 3 mois de protection

Primovaccination des adultes et des enfants de 6 ans ou plus¹



2 semaines
avant le départ



Si plus de 6 semaines se sont écoulées entre les deux doses, il faut reprendre la primovaccination à partir du début.

1^{ère} dose

Prendre la 1^{ère} dose au plus tard 2 semaines avant le départ en voyage

Date: _____

1 semaine
avant le départ



La protection commence environ 1 semaine après la prise de la 2^{ème} dose et dure environ 2 ans.

2^{ème} dose

Prendre la 2^{ème} dose au moins 1 semaine après la 1^{ère} dose, et au plus tard 1 semaine avant le départ en voyage

Date: _____

Départ
en voyage



Primovaccination des enfants de 2 à 6 ans¹

3 semaines
avant le départ



Si plus de 6 semaines se sont écoulées entre les deux doses, il faut reprendre la primovaccination à partir du début.

1^{ère} dose

Prendre la 1^{ère} dose au plus tard 3 semaines avant le départ en voyage

Date: _____

2 semaines
avant le départ



Si plus de 6 semaines se sont écoulées entre les deux doses, il faut reprendre la primovaccination à partir du début.

2^{ème} dose

Prendre la 2^{ème} dose au moins 1 semaine plus tard

Date: _____

1 semaine
avant le départ



La protection commence environ 1 semaine après la prise de la 2^{ème} dose et dure environ 6 mois.

3^{ème} dose

Prendre la 3^{ème} dose au moins 1 semaine après la 2^{ème} dose, et au plus tard 1 semaine avant le départ en voyage

Date: _____

Départ
en voyage



Dose de rappel de DUKORAL®¹

Adultes et enfants de 6 ans ou plus

Si vous avez pris DUKORAL® au cours des 2 à 5 dernières années, une seule dose de rappel suffit pour renouveler votre protection.

Si plus de 5 années se sont écoulées depuis l'administration de votre dernière dose, il est recommandé de reprendre la primovaccination à partir du début (2 doses) afin de renouveler votre protection.

1 semaine
avant le départ



1 dose de rappel

Date: _____

Départ
en voyage



Enfants âgés de 2 à 6 ans¹

Si l'enfant a reçu sa dernière dose de DUKORAL® entre 6 mois et 5 ans auparavant, 1 seule dose de rappel renouvelera sa protection. Si plus de 5 années se sont écoulées depuis sa dernière dose, il est recommandé que l'enfant soit revacciné selon le schéma complet de primovaccination (3 doses) pour renouveler sa protection.

Si vous avez d'autres questions au sujet de la prise de DUKORAL®, consultez votre professionnel de la santé.

DUKORAL® est indiqué comme traitement préventif et protecteur du choléra et de la diarrhée à *Escherichia coli* entérotoxigène (ETEC) producteur d'entérotoxine thermolabile (TL), soit seule ou en association avec l'entérotoxine thermostable (TS).

DUKORAL® ne traite pas la diarrhée causée par *E. coli* entérotoxigène (ETEC) après son apparition. Les personnes recevant un vaccin ne seront pas toutes entièrement protégées. DUKORAL® protège seulement contre le choléra et *E. coli* entérotoxigène (ETEC) producteur de TL. Il faut donc prendre les précautions nécessaires pour éviter de consommer des aliments et de l'eau contaminés. Des réactions allergiques et des effets secondaires pourraient survenir : douleur abdominale, diarrhée, fièvre, nausées et vomissements. En cas de diarrhée, une réhydratation s'impose.

Consultez la monographie de DUKORAL® au <http://webprod5.hc-sc.gc.ca/dpd-bdpp/langage-langage.do?lang=fra&url=t.search.recherche> pour connaître les contre-indications, les mises en garde et précautions, les effets secondaires, les interactions, la posologie et les directives d'utilisation clinique. Vous pouvez également obtenir la monographie en composant le 1-855-356-0831.

Référence : 1. Monographie de DUKORAL®, 22 décembre 2015.

VALNEVA Canada Inc.
600-3535, boul. Saint-Charles
Kirkland (Montréal), Québec H9H 5B9

© 2017 VALNEVA Canada Inc.
Marques de commerce utilisées sous licence.
DK0032017JN15F

Pour obtenir de plus amples renseignements,
visitez le site dukoralcanada.com

valneva